

# CARBUD

## NUTRICIÓN ORGÁNICA PARA LA YEMA

FERTILIZANTE LIQUIDO

**CARBUD**, debe ser aplicado foliarmente a todos los frutales que necesiten de apoyo poscosecha, con el objetivo de mejorar su madera y yema frutal. Cubrir toda la copa en un volumen de agua suficiente. Utilizar boquillas antideriva y nebulizador.

ESPECIES o CULTIVOS	DOSIS (L/ha)	OPORTUNIDAD
Cerezo	2,0-2,5	Iniciar inmediatamente finalizada la cosecha
Ciruelo, Duraznero, Nectarin	1,5-2,0	Iniciar inmediatamente finalizada la cosecha
Nogal, Avellano europeo	2,0-2,5	Verano-Otoño e inicio de Primavera
Palto	2,0-3,0	Verano-Otoño e inicio de Primavera
Almendro	2,0-3,0	Verano-Otoño e inicio de Primavera
Vid de mesa, Vino	1,5-2,0	Iniciar inmediatamente finalizada la cosecha
Arándano	2,0-2,5	Iniciar inmediatamente finalizada la cosecha
Kiwi	1,5-2,0	Fin del verano-inicio Otoño
Manzano, Peral	2,0-2,5	Iniciar inmediatamente finalizada la cosecha
Naranjo, Limón, Mandarino	1,5-2,0	Otoño e inicio de primavera
Frutilla, Frambueso	2,0-2,5	Iniciar inmediatamente finalizada la cosecha

Nota: en caso de ser necesario, puede repetir la aplicación a los 20-30 días después de la primera.

COMPOSICIÓN:	p/v %
Carbono Orgánico	3,5 %
Potasio (K <sub>2</sub> O)	2 %
Magnesio (MgO)	1 %
Cinc (Zn)	1 %
Boro (B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	1 %
Metales Pesados	Contenido mg/lt
Mercurio	0,05 %
Cadmio	0,5 %
Plomo	2,0 %
Arsénico	0,3 %
pH	5,0 - 6,0
Densidad	1,0 - 1,12 g/mL

- Mejor Diferenciación, Calidad de la Madera y Yema Frutal.
- Mayor retorno floral para la cosecha siguiente.
- Primordios florales de mayor calidad y tamaño.
- Mitiga el añaerismo.
- Sube la función clorofílica (unidades SPAD) y sostiene la funcionalidad de las hojas.